

3. HAKOMISMÄNNYT

Soidinpaikkojen läheisyydessä sijaitsevat iäkkäitä ja vankkaoksaisia mäntyjä kasvavat rämeet, koosta riippumatta, ovat arvokkaita ukkometsojen talvisen ruokailun kannalta. Metsot käyttävät talviaikaan yksinomaan männynneulasia ravintonaan ja ruokailu keskittyy vuodesta toiseen samoihin hakomispuihin, jotka on helppo tunnistaa maastossa - puiden alta hangelta löytyy hajaallaan sijaitsevia neulasulosteita. Rämepuustojen hakkuissa hakomismännyt tulee säästää ja jatkuvuuden kannalta tehdä tilaa myös sopivaoksaisille tulevaisuuden hakomispuille.



Ojittamattomilla rämeillä ja korvissa kosteusolot ovat edulliset monille hyönteisille ja koppelo ohjaa poikueensa ensi alkuun ruokailemaan sinne. Metsäkanalintujen poikaset ovat usean viikon ajan pääosin hyönteisravinnon varassa ja kesäkuun sateiset sekä kylmät Sääolot voivat muodostua kohtalokkaaksi pienille poikasille. Hyönteiset eivät liiku ja toisaalta vaarana on höyhenpeitteen kastuminen ja sen

seurauksena kylmettyminen.